

平成28年3月

お客様各位

小林薬品工業株式会社

ユニペインL

使用上の注意改訂のお知らせ

平素より弊社製品をご推奨いただき厚く御礼申し上げます。

この度、厚生労働省より平成28年3月22日付薬生安発0322第1号を受け、弊社「ロキソプロフェンナトリウム水和物含有 解熱鎮痛薬」の「使用上の注意」の一部を改訂いたしますので、ご連絡申し上げます。

弊社該当製品「ユニペインL」につきましては、順次、本通知に基づく改訂を致します。これら改訂を反映した製品がお手元に届くまでには、しばらく時間がかかりますので、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

今後のご使用に際しましては、下記通知内容をご参照いただくとともに、使用に際してご不明な点がございましたら、弊社お客様相談室までお問い合わせをいただきますようお願い致します。

弊社お客様相談室：電話 058-278-3933／平日10時～16時 土・日・祝日を除く

謹白

改訂内容（下線部が追記箇所です。）

改訂後	改訂前
[相談すること] 1. 現行通り 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること (1)現行通り (2)服用後、消化性潰瘍、むくみがあらわれた場合。 また、まれに消化管出血(血を吐く、吐き気・嘔吐、腹痛、黒いタール状の便、血便等があらわれる)、消化管穿孔(消化管に穴があくこと。吐き気・嘔吐、激しい腹痛等があらわれる)、 <u>小腸・大腸の狭窄・閉塞(吐き気・嘔吐、腹痛、腹部膨満等があらわれる)</u> の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。 (3)現行通り 3. 現行通り 4. 現行通り	[相談すること] 1. 略 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること (1)略 (2)服用後、消化性潰瘍、むくみがあらわれた場合。 また、まれに消化管出血(血を吐く、吐き気・嘔吐、腹痛、黒いタール状の便、血便等があらわれる)、消化管穿孔(消化管に穴があくこと。吐き気・嘔吐、激しい腹痛等があらわれる)の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。 (3)略 3. 略 4. 略